

2.4 La conchyliculture



Ostréiculteur du Bassin d'Arcachon

La Nouvelle-Aquitaine est la première région conchylicole en Europe ; elle englobe les deux bassins ostréicoles majeurs de Marennes-Oléron et Arcachon. La filière conchylicole génère un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros.

La conchyliculture française se situe au 2^e rang européen en volume et en valeur. Elle constitue le premier secteur aquacole du pays. Sur la façade Sud-Atlantique, il s'agit d'une activité majeure et emblématique.

◆ La première région européenne de production conchylicole

La production est constituée par l'ostréiculture (élevage des huîtres) qui se concentre dans les 2 grands bassins de Marennes-Oléron et Arcachon, à laquelle s'ajoute la mytiliculture (élevage des moules), plus modeste, en Charente-Maritime.

Production conchylicole de la Nouvelle-Aquitaine



source : Ministère de la Transition énergétique et solidaire - CNC

Les produits d'aquaculture et en particulier les coquillages marins sont des espèces sensibles à la qualité du milieu marin (qualité de l'eau, température, salinité, etc.), qui peut influencer sur leur reproduction mais également favoriser le développement de pathologies spécifiques (cf fiche 4.5 « Le suivi zoosanitaire des coquillages »).

◆ Une activité dépendante du milieu

Pour Marennes-Oléron, l'année 2018 a été caractérisée par une hausse des mortalités des naissains, une légère baisse de celles des huîtres de 2^{ème} année et une légère hausse pour les huîtres de 3^{ème} année. En 2018, le captage du naissain a été très faible (70 naissains/coupelle) comparativement à l'année précédente, avec 5 fois moins de captage sur tubes et coupelles, observé sur l'ensemble du Bassin.

Le secteur de la Seudre fait exception cette année, de part l'intensité du captage observé de ce secteur et la taille relativement grande du naissain (15 % supérieur à 15 mm). Ce captage localement plus important et précoce est certainement lié aux grandes quantités de larves « grosses » observées en Seudre cet été.

Pour le bassin d'Arcachon, l'année 2018 a été caractérisée par un taux de mortalité des naissains plus faible qu'en 2017. Pour les autres classes d'âge les mortalités restent relativement faibles (hormis les huîtres d'écloserie). À noter un excellent captage sur l'ensemble du Bassin d'Arcachon (d'après l'abaque cf. *Reproduction de l'huître creuse dans le Bassin d'Arcachon - Année 2015 - Ifremer*) qui a majoritairement eu lieu fin août. Le pourcentage de perte des naissains, bien qu'en légère baisse par rapport à 2017, reste néanmoins important.

◆ Une activité mytilicole concentrée dans le Pertuis Breton

Concentrée sur le rivage nord du Pertuis Breton (dont Charron petit port conchylicole connu et réputé), la mytiliculture se pratique également dans le Pertuis d'Antioche sur filières et sur pieux. À noter l'absence de surmortalité pour la deuxième année consécutive.

La saison de production 2018 a été caractérisée par un déficit de croissance (déficit pluviométrique et températures élevées dues à la sécheresse estivale) mais aussi, par une belle qualité des moules marchandes. La saison a également été marquée par un captage important et qui a duré au cours de l'été sur les élevages en place.



Chaland ostréicole remontant l'estuaire de la Seudre

 **IFREMER** : présentation de la filière aquacole

CHIFFRES CLÉS 2018

40% de la production ostréicole nationale

300 millions d'euros de chiffre d'affaires



Plus de **1000** entreprises conchylicoles

Plus de **3000** emplois permanents à temps plein

2 comités régionaux conchylicoles

FAITS MARQUANTS

Grâce au travail remarquable d'un petit groupe d'ostréiculteurs passionnés, des huîtres d'excellence sont produites dans les marais de la pointe du nord Médoc. Ces huîtres affinées ont été distinguées d'une médaille d'or au salon de l'agriculture de Paris



- Bassins et zones de production conchylicole
- Cadastre conchylicole
- Principaux ports ostréicoles

Les ports ostréicoles de Charente-Maritime

- 1 Port de l'île d'Aix
- 2 Angoulins, Port du Loiron
- 3 Port d'Ars-en-Ré
- 4 Arvert, Port de Coux
- 5 Port du Chapus
- 6 Port de Mérignac
- 7 Port de Chaillevette
- 8 Port du Pavé
- 9 Port du Château d'Oléron
- 10 Port des Boucholiers
- 11 Port de la Baudissière
- 12 Port d'Arceau
- 13 Port de l'Eguille
- 14 Port d'Orivol
- 15 Port de la Flotte-en-Ré
- 16 Port Nord
- 17 Port du Plomb
- 18 Port de Brouage
- 19 Port de la Cayenne
- 20 Port de Mornac
- 21 Port de Port-des-Barques
- 22 Port de Rivedoux
- 23 Port de la Perrotine
- 24 Port de Saint-Martin-de-Ré
- 25 Port de Saint-Trojan
- 26 Chenal d'Ors
- 27 Port de la Route Neuve

Les ports ostréicoles du Bassin d'Arcachon

- 28 Port de la Barbotière
- 29 Port le Four
- 30 Port des Jacquets
- 31 Port du Cap-Ferret
- 32 Port d'Andornos-les-Bains
- 33 Port de La Teste-de-Buch
- 34 Port du Canon
- 35 Port du Petit Piquey
- 36 Port du Grand Piquey
- 37 Port de Pirailan
- 38 Port de L'Herbe
- 39 Port de Claouey
- 40 Port de Taussat
- 41 Port de Cassy
- 42 Port d'Audenge
- 43 Port de la Hume
- 44 Port de Larros
- 45 Port du Canal

Projection : RGF 93 / Lambert 93

0 12 24 36 48 Nq

0 25 50 75 100 km

Sources : DDTM 17, DDTM 33, DDTM 85
Copyrights : ©SHOM, ©BD ALTI (IGN), ©GEOFLA (IGN)
Réalisation : DIRM SA / MCPPLM
Date : Février 2019



DIRECTION
INTERREGIONALE
DE LA MER
SUD-ATLANTIQUE